

I.C. 3 "de Curtis – Ungaretti - Iovino" ad Indirizzo Musicale

Scuola dell'Infanzia -Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Sede Centrale: Via Viola, 20 - 80056, Ercolano (NA) - tel. 081/7713113

Plesso Ungaretti: Via Case Vecchie - tel. 0817393861 - Plesso Genovese: Via Palmieri - tel. 0817881291

Sede di Via Cuparella - tel. 0817321721

C.F. : 95170720635 - Cod. mecc. : NAIC8DA007

www.ic3decurtisungaretti.edu.it - e-mail: naic8da007@istruzione.it - naic8da007@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 189

Ercolano, 30/01/2026

IC3 "de Curtis Ungaretti" - Ercolano
Prot. 0000955 del 30/01/2026
IV (Uscita)

**A tutto il personale e alle famiglie
Al DSGA
p.c. Famiglie e Personale tutto
Al sito web**

Oggetto: Informativa ossiuri e altri parassiti intestinali

Si comunica alle SS.LL. che, nel quadro delle attività di prevenzione della salute a scuola al fine di fornire al personale scolastico e alle famiglie informazioni sugli ossiuri, consentendone una corretta prevenzione, a seguito di comunicazione informale di sospetto caso di ossiuri, si trasmette la seguente nota informativa per i casi di parassitosi intestinale (ossiuri, ascaridi, tenia, ecc.) che si possono manifestare nei bambini.

L'insegnante che venga a conoscenza della possibile presenza di infezione, dopo averne dato informazione al Dirigente Scolastico, nel rispetto delle norme sulla privacy, informerà le famiglie sulla necessità di controlli preventivi sui propri figli. Si confida nella puntuale e precisa collaborazione di tutti. Si allega alla presente materiale informativo.

Materiale informativo

OSSIURIASI COS'È

L'ossiuriasi è un'infestazione intestinale provocata da piccolissimi vermi, gli ossiuri, a forma di spillo. Si manifesta con prurito alla zona anale, disturbi del sonno e irritabilità, ma spesso è asintomatica. È diffusa in tutto il mondo e frequentemente interessa i bambini in età scolare e prescolare. L'uomo è l'unico ospite; gli animali domestici non sono contagiati. L'uomo ingerisce le uova: in un periodo di uno - due mesi la femmina adulta di ossiuro gravida raggiunge la zona perianale dove deposita le uova.

COME SI DIFFONDE

Si trasmette principalmente per via oro-fecale: le uova sono trasportate attraverso le mani e le dita e attraverso oggetti contaminati.

INCUBAZIONE

Dalle 2 alle 6 settimane

CONTAGIOSITÀ

Le femmine di ossiuri gravide di norma muoiono dopo aver depositato le uova muoiono e le uova rimangono infettive negli ambienti chiusi. Nel caso in cui una persona sia infestata dagli ossiuri è necessario assumere la terapia specifica, secondo le indicazioni del curante; cambiare le lenzuola e quotidianamente la biancheria intima, lavando tutto in lavatrice a 60°C.

PREVENZIONE

Cercare di prevenire le infezioni da ossiuri non è difficile: ricordare ai bambini di lavare le mani dopo essere andati in bagno, dopo aver giocato fuori, e prima di mangiare, assicurarsi che facciano la doccia o il bagno e cambino l'intimo ogni giorno, mantenere corte e ben pulite le unghie dei bambini, lavare i pigiami dei bambini spesso. La responsabilità principale della prevenzione e trattamento dell'ossiuriasi è dei genitori dei bambini che frequentano una collettività. In caso di sospetta infezione è necessario rivolgersi al medico curante (pediatra) che darà tutte le indicazioni relative alla situazione specifica. I collaboratori scolastici, come di prassi, sono tenuti a pulire accuratamente con candeggina e prodotti igienizzanti pavimenti, bagni, banchi e sussidi, i docenti devono far lavare ai bambini le mani dopo l'uso del bagno. Il trattamento farmacologico è personale e deve avvenire su prescrizione del medico curante. Qualora si manifestino più casi di parassitosi, tipo epidemia della popolazione scolastica, si farà richiesta alla U.O. distrettuale di un intervento di educazione sanitaria inteso ad informare i soggetti interessati sulle corrette procedure personali da adottare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Stefania Montesano

Firma autografa sostituita a mezzo
stampai sensi dell'art. 3 c. 2 del
D.Lgs. 39/93